

CHLORAMINOPHENE® chlorambucil

INDICATIONS AMM

Le *chlorambucil* est un agent alkylant bifonctionnel du groupe des moutardes à l'azote, déprimant surtout la lignée lymphoïde, indiqué dans le traitement :

- de la leucémie lymphoïde chronique,
- des lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Médicament qui peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville (LISTE I). Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une seule présentation est disponible, sous plaquettes thermoformées: boîte de 30 gélules de couleur blanche opaque dosées à 2 mg (22,10 €).

A conserver à une température inférieure à 25°C.

POSOLOGIE

Il est recommandé de prendre la dose journalière **en une fois, le matin et à jeun** :

- 1 à 6 gélules par jour tous les jours en traitement continu,
- ou 6 à 10 mg/m²/j pendant 5 jours tous les 30 jours.

Chez le malade insuffisant rénal, si clairance < 30ml/min, diminuer les posologies: 3 à 5 mg/m²/j.

INTERACTIONS

Associations contre indiquées : vaccin contre la fièvre jaune.

Associations à prendre en compte :

-Ciclosporine, tacrolimus : immunodépression excessive avec risque de pseudolymphomes.
(Le *chlorambucil* étant aussi un immunosuppresseur déprimant sélectivement la lignée lymphoïde).

-**Vaccins vivants atténués** : **risque de maladie généralisée éventuellement mortelle. Utiliser un vaccin inactivé lorsqu'il existe (poliomyélite).**

Tisanes ou préparation de phytothérapie : Attention aux nouvelles plantes dont les interactions sont inconnues.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Leucopénie	Surveillance des signes d'infection. Surveillance hématologique fréquente et régulière.	Dose dépendante et cumulative. Réversible. Arrêt du traitement à voir avec le spécialiste si le taux des granulocytes (polynucléaires) est inférieur à 2G/L.
Thrombopénie	Surveillance des signes d'hémorragies. Surveillance hématologique fréquente et régulière.	Dose dépendante et cumulative. Réversible. Voir avec le spécialiste pour une adaptation posologique.
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Eviter les aliments frits, gras ou épicés. Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers.	Traitement antiémétique standard éventuel. Ne pas reprendre la prise ou doubler la suivante en cas de vomissements. Si vomissement >1 par 24h, arrêt du traitement et adaptation posologique à voir avec le spécialiste.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Eruption cutanée	Limiter le soleil et toute exposition à la chaleur. Eviter les vêtements et les chaussures trop serrées. Utiliser un savon doux sans parfum. Eviter les travaux irritants pour les mains. Eviter les pansements adhésifs.	Tremper les mains et les pieds dans l'eau fraîche, puis sécher sans frotter. Appliquer une crème émolliente (type Dexéryl®). Analgésiques standards si nécessaire (paracétamol). Voir avec le spécialiste pour une adaptation posologique, voire un arrêt du traitement.

Surveillance pulmonaire clinique et radiologique en cas de traitement prolongé. Surveillance hépatique. Chez l'homme, provoque une oligospermie ou azoospermie en général définitive. Chez la femme, provoque une aménorrhée et une ménopause précoce.

RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS



Le CHLORAMINOPHENE® se prend à jeun en une prise par jour le matin à heure régulière avec un grand verre d'eau.



Les gélules ne doivent pas être ouvertes (poudre irritante), ni mâchées ou sucées.



Pendant le traitement, il est important de boire davantage pour maintenir le bon fonctionnement du rein (si possible 1.5 litre par jour).



Ne pas jeter les emballages entamés ni les comprimés dans votre poubelle.
Le patient peut rapporter les comprimés restants au pharmacien pour aide dans les prises.



A conserver à une température inférieure à 25°C, dans l'emballage d'origine, hors de portée des enfants.



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. **Le patient doit préciser à son médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) qu'il prend ou qu'il souhaite prendre.**



Evitez l'exposition prolongée au soleil et protégez-vous si vous devez le faire.



Ne pas prendre de CHLORAMINOPHENE® en cas de grossesse et d'allaitement. Utilisez une méthode de contraception efficace.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



En cas d'oubli d'une prise, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler la prise suivante. Prendre la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le carnet de suivi.



Contactez rapidement le médecin prescripteur en cas de:
- fièvre/signes infectieux pour réaliser une NFS en urgence.
- signes hémorragiques.
- difficultés à respirer ou toux anormale (radio du thorax: fibrose pulmonaire possible).

REMARQUES :

Pour une information complète, se reporter au RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit).

Remerciements : - au Groupe VOCC B PL : Observatoire dédié au cancer BPL, réseaux OncoBretagne et ONCO Pays de la Loire, cliniciens, pharmaciens et infirmières d'établissements volontaires B PL, Conseils de l'Ordre B PL, Directions Régionales du Service Médical B PL, OMEDIT B PL, Cancéropôle Grand Ouest, Comité de patients et URPS B PL
- au CH Cholet et au CHU Hôtel Dieu Nantes
- à l'OMÉDIT de Haute-Normandie et au Réseau Onco-Normand